

DEUX NOUVEAUX COLÉOPTÈRES HÉTÉROMÈRES (1),

PAR M. M. PIC.

Hylophilus tabaci n. sp. [*Hylophilidæ*].

Oblongo-elongatus, nitidus, griseo-pubescens, non hirsutus, testaceus, oculis nigris, thorace inæquali, lateraliter non angulato; elytris antice fortiter impressis; tibiis intermediis valde curvatis.

Oblong-allongé, brillant, orné d'une pubescence grise non hirsute, testacé avec les élytres vaguement rembrunis en partie sur leur milieu et les yeux noirs. Tête courte, subtronquée postérieurement avec les yeux plus larges que le prothorax, ceux-ci assez grands, écartés entre eux, touchant le bord postérieur de la tête, antennes assez longues, grêles, à 3 avant-derniers articles plus larges, globuliformes, le terminal court et épais; prothorax presque carré, à angles nuls, inégal en dessus, transversalement sillonné vers le milieu et impressionné devant la base, assez finement ponctué; élytres bien plus larges que le prothorax, peu longs, atténués postérieurement, fortement ponctués, marqués d'une forte impression transversale avant le milieu, avec une gibbosité nette de chaque côté de l'écusson; pattes courtes, les postérieures étant plus robustes que les autres, tibias antérieurs un peu et intermédiaires très arqués. Long. 1 mm. 5 environ.

Trouvé par feu A. Grouvelle dans des détritrus de tabac originaires de Sumatra.

Peut se placer près de *H. sumatræ* Pic, dont il se distingue nettement par la forme moins allongée et la coloration, la structure différente des antennes, les yeux non éloignés du bord postérieur de la tête.

Macratria brevevittata n. sp. [*Anthicidæ*].

Elongata, nitida, griseo pubescens, rufa, sutura nigra, elytris antice et externe nigro vittatis, femoribus posticis nigro notatis.

Allongé, brillant, assez densément revêtu d'une pubescence grisâtre, fine et couchée avec quelques poils clairs courts et soulevés sur les élytres, plus longs sur l'avant-corps, de coloration générale rousse avec seulement la suture, une bande latérale allant de la base au milieu des élytres et partie des cuisses postérieures noirs.

(1) Les deux nouveautés sont représentées par les types uniques qui se trouvent au Laboratoire d'Entomologie du Muséum de Paris.

Tête assez grosse, un peu rétrécie en arrière, faiblement impressionnée au vertex, peu et finement ponctuée; antennes longues et grêles, très peu épaissies sur les derniers articles qui sont peu longs; prothorax assez long, un peu élargi en avant, à ponctuation granuleuse, rapprochée; élytres plus larges que le prothorax, longs, un peu atténués à l'extrémité, faiblement striés-ponctués, à intervalles finement ponctués; pattes robustes, rousses avec les cuisses postérieures noires sur leur milieu. Long. 4 mm.

Madagascar : Thosy (Ch. Alluaud).

Voisin de *M. laterufa* Pic et s'en distinguant, à première vue, par le prothorax moins robuste, la coloration non entièrement claire avec les élytres particulièrement marqués de foncé.